

ご使用になる前に必ずお読みください



安全にお使いいただくため、処方された患者さん以外はお使いにならないでください。

この薬を他の人に譲ってはいけません。




貼付部を紫外線にあてると**光線過敏症**をおこすことがあります。

- (1) 戸外に出るときは天候にかかわらず、濃い色の衣服、サポーター等を着用し貼付部を紫外線にあてないでください。
- (2) はがした後、少なくとも4週間は同様に注意してください。

詳しくは中面をご覧ください

このくすりは妊娠後期の女性には使用できません。

● 妊娠後期の女性は使用しないでください。



使用上の注意

モーラステープ® 20mg

モーラステープ® L 40mg

モーラステープ® パップXR 120mg

モーラステープ® パップ 30mg

モーラステープ® パップ 60mg

をご使用の患者さんへ



## 管理上のご注意

このくすりを他人に譲ってはいけません。  
お子さん、お孫さん、ご友人などにも  
譲らないでください。

- 使用上の注意を知らず、  
紫外線にあたり、かぶれる  
おそれがあります。



## 使用中のご注意

外での活動はひかえ、貼ったところを  
紫外線にあてないでください。  
かぶれるおそれがあります。

- 貼ったところを紫外線に  
あてないようにしましょう。



- 長袖・長ズボンやサポーター等で、  
貼ったところを紫外線から  
さえぎるようにしましょう。



## 使用後のご注意


はがした後も、少なくとも4週間は  
紫外線にあてないよう注意してください。

- はがした後もくすりは皮膚に残っています。  
使用中と同じように、貼った  
ところを紫外線にあてない  
よう注意しましょう。



## ご 注 意 !!

紫外線はくもりの日でも、ふりそそいでいます。  
外に出るときは、くもりの日も長袖・長ズボン  
やサポーター等で、貼ったところを紫外線  
からさえぎるよう注意してください。



## その他の注意事項

- 貼ったところにかぶれが起こったら、すぐに使用を中止  
し、医師または薬剤師にご相談ください。
- かぶれた部分を紫外線にあてると悪化し、まれに全身  
に症状が拡がる可能性があります。
- かぶれのあとにしみ(色素沈着)が残ることがあります。