

経皮吸収型・気管支拡張剤

ツロブテロールテープ 0.5mg・1mg・2mg「YP」を ご使用の患者さんへ

袋の中にお薬が1枚入っています。
0.5 mg, 1 mg, 2 mg の3種類がありま
すが, 使い方はいずれも同じです。



どんなお薬?



- このお薬は気管支喘息, 気管支炎, 呼吸困難などの症状をやわらげます。
- このお薬は, 気管支を広げる成分が皮膚から吸収されるお薬です。

どこに貼るの?


- 1日1回, 胸, 背中, 上腕のいずれか1カ所に貼ってください。



胸



背中



上腕



- 傷や湿疹等のあるところには貼らないでください。
- 同じところに続けて貼ると, かゆくなったり, 赤くなったり, かぶれたりすることがありますので, 場所を変えて貼ってください。
- テープをはがしてしまう可能性のあるお子様には, 手の届かないところ(背中)に貼ってください。

裏面もご覧ください




テープの貼り方




貼る場所をよくふいて、水分や汗を取り除きます。




「切り口」表示に従って、切ります。




もう一方の「切り口」からも切ります。




テープを取り出します。




テープを山折りにし、フィルムを少し浮かせます。



片方のフィルムをはがします。



残りのフィルムを持って、テープを胸、背中、上腕の**いずれか1カ所**に貼り、軽く押さえます。



残りのフィルムをずらしながら全体を貼ります。貼った後、手のひらで全体をまんべんなく押さえてください。



※使い終わったテープは、必ずはがしてください。

何か異常が認められたときは、医師または薬剤師にご相談ください。

ご注意

- このお薬を他の人にゆずってはいけません。
- このお薬は1度はがしたら、再び貼り直すことができません。
- 高温を避け、お子様の手の届かないところに保管してください。
- お薬は、使用する直前に開封してください。
- ご使用済の袋、フィルムおよびテープを廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってお出してください。
- ご使用済のテープおよびフィルムは、乳児の手の届かないところに廃棄してください。

医療機関名