

に相談してください。

※このテープを使って、何か変だと感じることがあった時は、主治医または薬剤師

- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 使用する前または、袋を開けず、高温を避けて保管してください。

### 保管上の注意

- テープが少しはかれた場合は、刺激の少ない絆創膏等で固定してください。
- テープは一度はかしたら、再び貼り直すことができません。
- 粘着面に指かぶれると粘着力が低下して、うまく貼れないことがあります。
- ねたり、カールしたりするおそれがあります。
- テープからアクリルをはかす時、強くひっぱらないでください。強まると破れて、新しいテープに貼りかえる時は、場所を変えて貼ってください。
- 同じところに続けて貼ると、かゆくなったり、かぶれたりすることがありますので貼らないでください。
- 汗をかきやすい部位や、クリーム、軟膏等をぬった部位は、はかれやすくなるので貼らないでください。
- 傷口や湿疹のある部位には貼らないでください。
- (背中)に貼ってください。
- テープをはかしてしまふ可能性のあるお子様には、手の届かないところに貼る部位を乾いたタオル等でよく拭き、清潔にしてください。

### 貼る際の注意

経皮吸収型・気管支拡張剤

YUTOKU

# ツロブテロールテープ

0.5mg / 1mg / 2mg「YP」をご使用の患者さんへ

## 使用方法の注意

このテープは、あなたの症状に合わせて処方されたお薬です。  
医師または薬剤師の指示に従って正しく使用してください。

※このテープを家族や  
他の人にあげては  
いけません。




**貼る回数** このテープは**1日1回**、必ず貼りかえてください。

**貼る部位** 胸、背中、上腕のいずれか**1カ所**に貼ってください。


# 貼り忘れ防止チェックシート

1週目		2週目	
日付	チェック	日付	チェック
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	


このテープは **1日1回**，  
胸，背中，上腕のいずれか **1カ所** に貼ります



胸



背中



上腕

2mg  
0.5mg・1mg

