

お客様 各位

祐徳薬品工業株式会社

経皮鎮痛消炎剤

# モーラステープ20mg

# モーラステープL40mg

## アルミパックデザイン変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
 平素は弊社製品に対し格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。  
 このたび、経皮鎮痛消炎剤「モーラステープ20mg」「モーラステープL40mg」につきまして厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知（2014年3月25日付）ならびに自主改訂により、【使用上の注意】を改訂いたしました。それに伴いアルミパックの注意書きが一部変更になりますので下記の通りご案内申し上げます。  
 今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

### ■変更箇所

#### モーラステープ20mg

##### 従来品

切り口 → → → 矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。 → → →

開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

← チャック →

**ご使用になる前に必ずお読みください**

安全にお使いいただくため、処方された患者さん以外はお使いにならないでください。この薬を他の人に譲ってはいけません。

貼付部を紫外線にあてると光線過敏症をおこすことがあります。

(1) 戸外に出るときは天候にかかわらず、濃い色の衣服、サポーター等を着用し貼付部を紫外線にあてないでください。

(2) はがした後、少なくとも4週間は同様に注意してください。

ぜんそく、じんま疹、息苦しさ、顔（まぶたなど）のはれといった症状や、貼付部の発疹・発赤、かゆみ、はれなどの異常があらわれた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。

**保管上の注意**

- 開封後は開封口のチャックをしめて保管してください。
- 乳幼児の手のとどかない所に保管してください。
- 直射日光や高温の場所をさけて涼しい所に保管してください。

2F190T

##### 変更品

切り口 → → → 矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。 → → →

開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

← チャック →

**ご使用になる前に必ずお読みください**

安全にお使いいただくため、処方された患者さん以外はお使いにならないでください。この薬を他の人に譲ってはいけません。

貼付部を紫外線にあてると光線過敏症をおこすことがあります。

(1) 戸外に出るときは天候にかかわらず、濃い色の衣服、サポーター等を着用し貼付部を紫外線にあてないでください。

(2) はがした後、少なくとも4週間は同様に注意してください。

・ぜんそく、じんま疹、息苦しさ、顔（まぶたなど）のはれといった症状や、貼付部の発疹・発赤、かゆみ、はれなどの異常があらわれた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。

**●妊娠後期の女性は使用しないでください。**

**保管上の注意**

- 開封後は開封口のチャックをしめて保管してください。
- 乳幼児の手のとどかない所に保管してください。
- 直射日光や高温の場所をさけて涼しい所に保管してください。

3F190M-B

「妊娠後期の女性は使用しないでください。」の一文が追記になります。

#### モーラステープL40mg

切り口 → → → 矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。 → → →

開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

← チャック →

**ご使用になる前に必ずお読みください**

安全にお使いいただくため、処方された患者さん以外はお使いにならないでください。この薬を他の人に譲ってはいけません。

貼付部を紫外線にあてると光線過敏症をおこすことがあります。

(1) 戸外に出るときは天候にかかわらず、濃い色の衣服、サポーター等を着用し貼付部を紫外線にあてないでください。

(2) はがした後、少なくとも4週間は同様に注意してください。

ぜんそく、じんま疹、息苦しさ、顔（まぶたなど）のはれといった症状や、貼付部の発疹・発赤、かゆみ、はれなどの異常があらわれた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。

**保管上の注意**

- 開封後は開封口のチャックをしめて保管してください。
- 乳幼児の手のとどかない所に保管してください。
- 直射日光や高温の場所をさけて涼しい所に保管してください。

1F90ST

切り口 → → → 矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。 → → →

開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

← チャック →

**ご使用になる前に必ずお読みください**

安全にお使いいただくため、処方された患者さん以外はお使いにならないでください。この薬を他の人に譲ってはいけません。

貼付部を紫外線にあてると光線過敏症をおこすことがあります。

(1) 戸外に出るときは天候にかかわらず、濃い色の衣服、サポーター等を着用し貼付部を紫外線にあてないでください。

(2) はがした後、少なくとも4週間は同様に注意してください。

・ぜんそく、じんま疹、息苦しさ、顔（まぶたなど）のはれといった症状や、貼付部の発疹・発赤、かゆみ、はれなどの異常があらわれた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。

**●妊娠後期の女性は使用しないでください。**

**保管上の注意**

- 開封後は開封口のチャックをしめて保管してください。
- 乳幼児の手のとどかない所に保管してください。
- 直射日光や高温の場所をさけて涼しい所に保管してください。

3F203M-B

《裏面もご覧ください》

変更品の中箱・ダンボールに  
**薬袋表示変更品** を  
 表示いたします。



販売名	包装	変更品出荷予定時期	変更品製造番号
モラステプ20mg	70枚	2014年8月中旬頃	P626T以降
	350枚	2014年8月下旬頃	P626T以降
	700枚	2014年8月下旬頃	P713S以降
モラステプL40mg	70枚	2014年9月上旬頃	P801U以降
	280枚	2014年8月中旬頃	P705T以降
	560枚	2014年8月中旬頃	P633T以降

※変更品の出荷予定時期は若干前後することがございます。