

2014年12月

お客様 各位

祐徳薬品工業株式会社

経皮鎮痛消炎剤

モーラス®パップ 30mgモーラス®パップ 60mg

薬袋記載内容追加について

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

このたび、経皮鎮痛消炎剤「モーラスパップ 30mg」「モーラスパップ 60mg」につきまして厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知（2014年3月25日付）ならびに自主改訂により、【使用上の注意】を改訂いたしました。それに伴い薬袋の注意書きが一部変更になりますので下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

従来品

ご使用になる前に必ずお読みください

安全にお使いいただくため、処方された患者さん以外はお使いにならないでください。この薬を他の人に譲ってはいけません。

貼付部を外側にあてると光線過敏症をおこすことがあります。

(1) 戸外に出るときは天候にかかわらず、濃い色の衣服、サボーターンを着用し貼付部を外側にあてないでください。

(2) はがした後、少なくとも4週間は同様に注意してください。

ぜんそく、じんま疹、蕁麻疹、顔（まぶたなど）のはれといった症状や、貼付部の発赤・発赤、かゆみ、はれなどの異常があらわれた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。

使用方法

- 薬面のフィルムをはがし、皮膚に貼ってください。
- 貼部を乾燥させてはなりません。
- 本剤は非経皮的に投与しますので、傷口、ながら皮膚には貼ってください。

保管上の注意

- 貼付後は薬袋のチャックを閉めて保管してください。
- 貼付部が半乾きにならないように保管してください。
- 直射日光や高温の場所を避けて涼しい所に保管してください。

変更品

ご使用になる前に必ずお読みください

安全にお使いいただくため、処方された患者さん以外はお使いにならないでください。この薬を他の人に譲ってはいけません。

貼付部を外側にあてると光線過敏症をおこすことがあります。

(1) 戸外に出るときは天候にかかわらず、濃い色の衣服、サボーターンを着用し貼付部を外側にあてないでください。

(2) はがした後、少なくとも4週間は同様に注意してください。

・ぜんそく、じんま疹、蕁麻疹、顔（まぶたなど）のはれといった症状や、貼付部の発赤・発赤、かゆみ、はれなどの異常があらわれた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。

妊娠後期の女性は使用しないでください。

使用方法

- 薬面のフィルムをはがし、皮膚に貼ってください。
- 貼部を乾燥させてはなりません。
- 本剤は非経皮的に投与しますので、傷口、ながら皮膚には貼ってください。

保管上の注意

- 貼付後は薬袋のチャックを閉めて保管してください。
- 貼付部が半乾きにならないように保管してください。
- 直射日光や高温の場所を避けて涼しい所に保管してください。

「妊娠後期の女性は使用しないでください。」の一文が追記になります。